

L'accouchement ou mise bas chez la chienne



Préparer la mise bas

- Préparer un **lieu au calme** où la chienne se sentira en sécurité et qui permettra d'élever la portée dans de bonnes conditions.
- **Une corbeille ou un panier** peut convenir pour une chienne de petit format mais il est préférable d'avoir une **caisse de mise bas** (avec barres anti-écrasement) pour les chiennes de grande taille.
- Prévoir une **garniture de nid facile à changer** : journaux, alèses, draps, tapis (type vet bed®)...
- Mettre une **source de chaleur** dans un coin de la caisse (tapis chauffant ou lampe chauffante) : le nid doit être à 30°C la première semaine. Laisser la possibilité à la chienne de se réfugier dans un coin moins chaud.
- **Habituer la future mère** à sa caisse plusieurs jours avant la date prévue de mise bas pour éviter tout stress.



Déroulement de la mise bas

- **Durée totale de la mise bas très variable**, en moyenne 4 à 8 heures mais pouvant aller jusqu'à 24 voire 36 heures pour de très grosses portées ou des chiennes mettant bas pour la première fois.
- **Rupture de la poche des eaux** (liquide jaune clair).
- Fortes **contractions** du ventre de la mère.
- Apparition du chiot au niveau de la vulve, entouré de sa poche (amnios) de couleur verdâtre.
- **Expulsion du chiot** : la poche se perce toute seule ou la mère la perce en la léchant. Si la poche n'est pas percée dans les 2 minutes, il faut l'ouvrir pour éviter que le chiot respire du liquide lors de ses premières inspirations.
- **Expulsion du placenta** 5 à 10 minutes plus tard. Il est souvent mangé par la mère. La mère **coupe le cordon**, souvent en mangeant le placenta.

Signes annonciateurs

- Apparition de **lait** dans les mamelles.
- Dilatation et **relâchement de la vulve** la dernière semaine ; relâchement des ligaments du bassin.
- **Fonte du bouchon muqueux** : écoulement vulvaire visqueux parfois un peu marron.
- Prétravail 12 à 36 heures avant la mise bas : la chienne **s'agite, halète, gratte, prépare son nid**.. La future mère s'isole ou au contraire devient très collante.
- La majorité des chiennes **refuse de manger** quelques heures avant l'accouchement.
- **Baisse de la progestérone** 18 à 48 heures avant mise bas.
- **Baisse de température corporelle de 1°C** 12 à 24 heures avant l'accouchement (pas toujours fiable).

Quand s'inquiéter ?

Une mise bas doit toujours être surveillée. Dans la majorité des cas, les mères se débrouillent seules. Il faut savoir être patient et n'intervenir qu'à bon escient.

Conserver à portée de main la fiche "**Mise bas chez la chienne : quand s'inquiéter ?**" ainsi que le numéro de **téléphone de votre vétérinaire** ou du vétérinaire de garde.

Les conseils de mon vétérinaire

