

Après la mise bas

chez la chienne

Pendant la mise bas



Dans la grande majorité des cas, **la chienne va s'occuper seule de ses chiots** : ouverture des poches, stimulation de la respiration grâce au léchage, coupe du cordon ombilical...

Parfois elle a besoin d'un peu d'aide. Dans ce cas :

- Environ 2 minutes après la naissance, si la mère ne l'a pas fait, il faut **ouvrir les poches** pour dégager le nez et la bouche du chiot.
- Une fois les poches rompues, **dégager les voies respiratoires**, par exemple à l'aide d'un mouche-bébé.
- **Couper le cordon ombilical** : pose d'une ligature environ à 1 cm de la paroi abdominale puis coupe du cordon en dessous.
- Vérifier qu'il n'y ait **pas d'anomalie congénitale** : anus non perforé, fente palatine, bec de lièvre...
- **Sécher et réchauffer le chiot.**
- Mettre le chiot à la mamelle pour qu'il **boive le colostrum** (1er lait qui contient les anticorps).

Soins à la mère

- Favoriser le **comportement maternel** : la maternité doit être un lieu calme auquel la chienne est habituée. Il ne faut pas intervenir plus que nécessaire.
- **Nettoyer minutieusement le nid**, après la mise bas puis minimum 1 fois par jour.
- **Alimentation adaptée à volonté.**
- Durant 5/6 jours après la mise bas, vérifier tous les jours la **température rectale** de la chienne. Elle ne doit pas avoir plus de 39°C. **Si c'est le cas, consulter sans tarder un vétérinaire.**
- **Vérifier l'aspect du lait et des mamelles.** Si les mamelles deviennent dures, changent de couleur ou que le lait devient épais, jaune, sent mauvais ou a un aspect anormal, la chienne fait probablement une **mammite**. **Il est urgent de consulter un vétérinaire** : la vie de la chienne et de sa portée sont en jeu !!



Soins aux chiots



- Le nid doit être **chauffé à 30°C** la première semaine afin de **maintenir la température corporelle des chiots à minimum 35°C**. En dessous de cette température corporelle, le chiot ne peut plus digérer et il ne faut surtout pas chercher à l'alimenter.
- Les chiots doivent être **pesés tous les jours** afin de vérifier qu'ils prennent bien du poids. Ceux qui grossissent moins vite seront surveillés attentivement et mis de préférence aux mamelles les plus en arrière.
- Au début de sa vie, **le chiot ne peut pas éliminer seul** (pipi et caca). Normalement c'est la mère qui se charge de le nettoyer. En cas d'élevage au biberon ou de mère déficiente, il faut bien **masser la région périnéale** avec un gant de toilette ou un coton imbibé d'eau tiède afin de provoquer la miction et la défécation après chaque repas jusqu'aux 3 semaines du chiot.
- Du fait de leur surface corporelle élevée, les chiots sont très sensibles à la **déshydratation**. Si un chiot arrête de téter, il faut lui donner lentement de l'eau sucrée ou lui faire des injections sous la peau (voir avec votre vétérinaire).
- Pour les chiots orphelins ou si la mère ne s'en occupe pas, il faut passer à l'**alimentation artificielle** avec un lait spécial pour chiot. Si le réflexe de succion est présent, on peut donner le **biberon**. Pour les chiots trop faibles, il est possible de **sonder** (faire avaler un petit tuyau qui descend jusque dans l'estomac). Ce geste peut faire peur mais il est facile à réaliser. Demander à votre vétérinaire de vous le montrer.
- A partir de 3 semaines, commencer à donner des **bouillies de croquettes ou de la pâtée** aux chiots pour débiter le sevrage et soulager la maman.

