

CRYPTORCHIDIE

chez le chien



Qu'est-ce que c'est ?

- On parle de **cryptorchidie** ou d'**ectopie testiculaire** lorsqu'un ou les deux testicules ne sont pas descendus dans le scrotum (ou « bourses », poche qui entoure et protège les testicules).
- Il s'agit d'une anomalie **assez répandue dans la population canine, plus rare chez les félins**.
- Le diagnostic définitif de cette anomalie se fait généralement **avant les 6 mois pour les petites races ou 6-12 mois chez les plus grandes races**.
- En raison du **caractère héréditaire suspecté** de cette affection, il est conseillé de ne pas faire reproduire les chiens atteints.
- La cryptorchidie n'entraîne **pas de signes cliniques spécifiques**.
- **A long terme des complications** peuvent survenir c'est pourquoi il est recommandé de traiter chirurgicalement cette anomalie.

Races touchées

Certaines races sont plus touchées par cette anomalie : **les petits chiens** (le Chihuahua, le Yorkshire, le Teckel, le Schnauzer miniature), le **Boxer, le Bouledogue anglais, le Husky, le Caniche et le Shetland, le Berger allemand** notamment.

Causes

Les testicules se développent pendant la vie embryonnaire dans l'abdomen, derrière les reins. Pendant la croissance du fœtus, **les testicules vont migrer vers le scrotum. Si ce mécanisme ne se fait pas correctement**, les deux testicules (ou un seul) n'atteignent pas le scrotum et restent soit en position abdominale, soit en position inguinale (dans l'aîne), soit en position sous-cutanée, en avant du scrotum.

Complications à long terme

- **Augmentation du risque du cancer des testicules** (tumeurs qui métastasent peu) entraînant des douleurs abdominales.
- **Augmentation du risque de torsion du testicule non descendu**. Ce phénomène est douloureux et entraîne la nécrose du testicule.
- **Une diminution de la fonction de reproduction**. Le testicule ectopique ne produit pas de spermatozoïde et a une influence négative sur le testicule fonctionnel.

Traitement et pronostic

Dans la majorité des cas, le traitement consiste à **retirer, chirurgicalement**, le testicule qui n'est pas en place.

- Il existe plusieurs méthodes chirurgicales.
- Une analyse histologique doit être réalisée.
- Le pronostic est bon après retrait des testicules.



Les conseils de mon vétérinaire

