

# Epillet : organe génital femelle

## Qu'est-ce que c'est ?



- L'épillet est une partie des plantes de la famille des **graminées**. Il ressemble à un épi de blé. Sa forme lui permet de **s'accrocher** facilement aux poils et de **progresser** toujours dans le même sens, c'est-à-dire la pointe vers l'avant.
- Il s'agit d'un **danger** rencontré principalement durant **l'été** et qui constitue un motif de consultation très fréquent à cette période.
- L'épillet peut s'introduire **dans n'importe quel orifice naturel de l'animal** (oreille, nez, vagin...) et peut même traverser la peau une fois fixé aux poils.

## Signes cliniques



- Animal qui **se lèche la région génitale**.
- Animal **agité**, qui tourne en rond.
- **Frottement de l'arrière train** au sol.
- **Ecoulements vulvaires** nauséabonds, parfois purulents.
- En cas d'infection, apparition de **fièvre**.
- Dans les cas avancés : **abattement, perte d'appétit**.

L'épillet peut rester à l'entrée du vagin, progresser en sous-cutané et former un **abcès**. Il peut également progresser dans le vagin puis l'utérus où il engendre une **inflammation** voire une **infection**.

Des **complications de perforation de l'utérus** existent et nécessitent une prise en charge importante car l'épillet se trouve alors dans la cavité abdominale.



## Diagnostic

Si votre animal présente les signes cliniques cités, en période estivale, il peut être victime d'un épillet vulvaire.

La réalisation d'une **échographie** permet généralement de localiser l'épillet dans les voies génitales. En complément un **bilan sanguin** sera réalisé.

**Cela peut être une urgence, contactez un vétérinaire rapidement.**

## TraITEMENT et pronostic

La prise en charge est réalisée sous **anesthésie générale** :

- Dans le cas d'un abcès : il sera vidé, et l'épillet retiré, parfois guidé par l'échographie.
- Epillet dans le vagin : généralement il sera retiré à l'aide d'un **endoscope**.
- Epillet dans l'utérus : la prise en charge est **chirurgicale**.
- Epillet ayant perforé l'utérus et se trouvant dans la cavité abdominale : Prise en charge **chirurgicale**.

En fonction de la présence de complications, des **traitements** seront mis en place (**antibiotiques, anti-inflammatoires**) et le port de la **collerette** sera fortement recommandé en fonction des cas.

Le **pronostic** est souvent **bon**, mais il devient **réserveé en cas de perforation de l'utérus**.

