

Intoxication au cannabis

Chez le chien



Qu'est-ce que c'est ?

- Le **cannabis** est une **plante** qui est utilisée comme stupéfiant. Généralement l'intoxication est liée à l'**ingestion accidentelle** de cannabis sous différentes formes (résine, gâteau contenant du cannabis appelé «space cake», feuilles coupées, cigarette roulée contenant cette herbe) ou plus rarement l'**inhalation de fumée**.
- La dose toxique chez le chien se situe entre 50 à 100 mg/kg de plante séchée (**pour un chien de 30kg, une demi-cuillère à café est toxique**). Plus la dose est importante, plus le risque de **complication d'une maladie préexistante** (maladie cardiaque, neurologique...), parfois non connue, augmente et **peut entraîner le décès de l'animal**. L'animal désorienté peut aussi subir un traumatisme.

Que faire lors d'urgence ?

- Essayez de lui **retirer ce qu'il lui reste dans la bouche** sans vous faire mordre.
- Essayez de **quantifier la quantité ingérée**.
- Notez ou **estimez l'heure de l'ingestion**.
- Appelez un vétérinaire** pour une consultation en urgence.

Le vétérinaire est soumis au secret professionnel, informez le correctement. En cachant les circonstances, établir le diagnostic devient difficile et la vie de l'animal est en jeu.

L'intoxication au cannabis peut être une urgence vraie.

Signes cliniques

Les signes cliniques peuvent apparaître entre **30 minutes et 3 heures après l'ingestion**. L'élimination est très lente, de ce fait, les signes peuvent persister entre 12 heures et 4 jours.

- Les signes neurologiques (les plus évocateurs):** **Agitation** ou état **comateux**, somnolence, animal habituellement calme qui devient **agressif**, comportement anormal (pousse contre les murs, **désorientation...**), **perte d'équilibre**, démarche anormale, dans les cas graves : **convulsion** et **coma**.
- Signes digestifs:** **Hypersalivation**, **vomissements**, incontinence fécale, **appétit augmenté** (animal se jette sur tout ce qu'il trouve).
- Signes cardiorespiratoires possibles:** Accélération ou ralentissement du rythme cardiaque, **respiration rapide**, augmentation ou diminution de la température corporelle.
- Autres signes:** Hyperesthésie (**réaction exacerbée lors d'un stimulus normal auditif ou tactile**), mydriase (**dilatation des pupilles**).

Traitement et pronostic



Une surveillance vétérinaire est nécessaire. Une **hospitalisation**, pouvant aller jusqu'à plusieurs jours, est quasiment toujours mise en place à cause de l'élimination lente de la molécule et des complications neurologiques possibles.

Si l'ingestion est très récente (moins de 30 minutes) et que l'animal ne présente pas de signes cliniques, **une injection pour le faire vomir** sera réalisée. Une **perfusion** sera mise en place. En fonction des signes cliniques (neurologiques et digestifs) des **traitements adaptés** seront instaurés.

Généralement le pronostic est très bon, cela dépend de la quantité ingérée, de l'état général de l'animal, de son âge et de son gabarit.

notes