

Intoxication au paracétamol

Chez le chien



Qu'est-ce que c'est ?

- Le **paracétamol** (=acétaminophène) est retrouvé dans presque toutes les salles de bain. Il est utilisé par l'Homme pour lutter contre la fièvre et la douleur. Le paracétamol est retrouvé dans le Doliprane®, Efferalgan®, Dafalgan®, Actifed®, Fervex®...
- Ne pas réaliser d'automédication à son chien** car cette molécule est **toxique** pour lui.
- Avant d'agir, le paracétamol doit être **transformé dans le foie par une protéine**. Or **cette protéine est peu présente chez le chien**. De ce fait, le paracétamol **s'accumule dans le foie et détruit les cellules** qui composent cet organe. Puis il transforme l'hémoglobine (protéine contenue dans les globules rouges) en méthémoglobine. **Le sang perd alors sa capacité à transporter l'oxygène** dans le corps et prend une couleur brun-chocolat.

Que faire lors d'urgence ?

Si vous vous rendez compte que votre chien a ingéré des comprimés :

- Retirez les médicaments** qu'il reste à la portée de l'animal et **gardez l'emballage** pour le montrer au vétérinaire.
- Essayez de **quantifier la quantité ingérée**.
- Contactez un vétérinaire** pour une consultation en urgence (votre animal pourra être gardé sous surveillance vétérinaire pendant plusieurs jours).

Il s'agit d'une **urgence vraie**. En effet, faute d'une prise en charge rapide, l'évolution vers un coma est assez rapide et **le décès de l'animal peut survenir dans les 24-48h**.

Signes cliniques

Les premiers signes apparaissent généralement **2 à 12 heures après ingestion**:

- Digestifs:** Anorexie, douleurs abdominales, diarrhée, sang dans les selles, vomissements avec parfois du sang dedans.
- Cardiorespiratoires:** Dyspnée (difficultés respiratoires), tachycardie (pouls rapide), tachypnée (respiration rapide), cyanose (muqueuses violettes).
- Autres:** Abattement parfois très marqué, ictère (muqueuses jaunes), gonflement de la face, du cou, de la poitrine et des membres, coloration brune des urines.

Traitement et pronostic



Si l'intoxication remonte à moins de 1 heure voire 2 heures, **une injection pour faire vomir** pourra être réalisée. Votre animal sera probablement **hospitalisé** (surtout lors de cas grave). En fonction du cas le vétérinaire pourra réaliser :

- Des **perfusions** pour accélérer l'élimination du paracétamol.
- Une **mise sous oxygène**.
- Des **analyses de sang** notamment pour évaluer l'anémie.
- Une **transfusion sanguine** si l'anémie est trop importante.
- Des **mesures de réchauffement**.
- Des **traitements généraux et spécifiques**.

Le **pronostic** dépend de :

- La **dose ingérée** (dose toxique 100 mg/kg, des signes cliniques peuvent apparaître avant cette dose), **un comprimé de 1000mg pour entraîner le décès d'un chien de 10kg**.
- La **mise en place précoce du traitement** après l'ingestion.

Le **pronostic est réservé** notamment lors des trois premiers jours.