

Intoxication à l'aspirine

Chez le chien



Qu'est-ce que c'est ?

- **L'aspirine** (= acide acétylsalicylique) est retrouvée dans presque toutes les salles de bain. Elle est utilisée par l'Homme pour lutter contre la fièvre, la douleur et l'inflammation. L'aspirine est retrouvée dans l'Aspro®, l'Aspégic®, Juvépirine®, Aspirine UPSA®... Cette molécule est parfois utilisée chez le chien pour certaines indications très spécifiques.
- **Ne pas réaliser d'automédication à son chien** car cette molécule peut être toxique pour lui. Il peut aussi en ingérer accidentellement.

Que faire lors d'urgence ?

Si vous vous rendez compte que votre chien a ingéré des comprimés :

- **Retirez les médicaments** qu'il reste à la portée de l'animal et **gardez l'emballage** pour le montrer au vétérinaire.
- Essayez de **quantifier la quantité ingérée**.
- **Contactez un vétérinaire** pour une consultation en urgence (votre animal pourra être gardé sous surveillance vétérinaire pendant plusieurs jours).
Ne rien donner d'autre à l'animal.

Il s'agit d'une **urgence vraie**. Cette intoxication peut entraîner le décès de l'animal quelques jours après l'ingestion.

Signes cliniques



Les premiers signes apparaissent généralement entre **30 minutes et quelques heures après ingestion** et évoluent sur 24 heures. Les signes cliniques qui peuvent apparaître sont :

- **Digestifs:** Vomissements qui parfois peuvent être hémorragiques, nausées, **diarrhées**, **douleurs abdominales**.
- **Nerveux:** Hyperesthésie (**réaction exacerbée à un stimulus normal visuel ou auditif**), **mouvements anormaux des yeux**, **convulsions** et parfois coma.
- **Autres:** **Abattement**, **fièvre**, **respiration marquée et plus forte**, parfois ictère (muqueuses jaunes).

Traitement et pronostic



Si l'intoxication remonte à moins de 2 heures, une injection pour le **faire vomir** sera réalisée. Votre chien sera probablement **hospitalisé** (surtout lors de cas grave). En fonction du cas le vétérinaire pourra réaliser :

- Des **perfusions**.
- Des **traitements digestifs** (pansements gastriques, charbon activé, anti-acide).
- Des **analyses de sang**.
- Une **mise sous oxygène**, voire une assistance respiratoire dans les cas graves.
- Des **mesures de refroidissement**.
- Des **traitements spécifiques** aux signes cliniques (convulsions par exemple).

Le **pronostic** dépend de :

- La dose ingérée (dose toxique 100-400 mg/kg, **un comprimé de 1000mg peut entraîner le décès d'un petit chien**).
- L'âge du chien.
- Maladies préexistantes chez le chien (insuffisance rénale ou hépatique).
- La mise en place précoce du traitement après l'ingestion.

Notes