

La cataracte

Chez le chien



Qu'est-ce que c'est ?

- Le **cristallin** est une **lentille transparente** qui se trouve dans l'œil et qui a pour rôle de **concentrer les rayons lumineux au fond de l'œil**. Il doit rester transparent pour voir correctement.
- La **cataracte** correspond à la **perte de transparence de ce cristallin qui prend un aspect opaque et blanc/gris**. Ainsi les animaux atteints **deviennent petit à petit aveugles**.
- Cette maladie est **assez fréquente** et **plusieurs causes sont possibles**. Elle peut être héréditaire, liée à l'âge, liée à une maladie (comme le diabète) ou provoquée par une inflammation/infection dans l'œil.

Signes d'appel



Si votre chien a **du mal à éviter des obstacles** à sa hauteur, cela peut traduire une **perte de vision** qui peut être causée par la cataracte.

Si le centre des yeux de votre chien prend un aspect opaque et blanc/gris cela peut être la cataracte.

Examens complémentaires



Il n'existe pas de traitement médical, **le seul traitement pour permettre à l'animal de voir de nouveau est la chirurgie**. Avant la chirurgie des examens complémentaires sont réalisés pour s'assurer que l'animal est un bon candidat à cette dernière :

- Analyses sanguines.**
- Évaluation du fonctionnement de la rétine** (sous anesthésie générale).
- Examen complet de l'œil** avec du matériel spécialisé.
- D'autres examens peuvent être proposés** en fonction du cas.


Traitement

Si l'animal est en **bon état général** et ne présente **aucune contre-indication** la chirurgie peut être réalisée sous **anesthésie générale**.

Un traitement médical (comprimés, collyres) est initié quelques jours avant la chirurgie. **Le traitement local à base de collyres sera poursuivi plusieurs semaines voire plusieurs mois après la chirurgie**.

La chirurgie utilisée est **la même que celle réalisée chez l'Homme**.

Durant la chirurgie **le cristallin malade est retiré** de sa capsule pour permettre le passage des rayons lumineux. Il est remplacé par un **cristallin artificiel** pour obtenir de meilleurs résultats au niveau de la vision en post-opératoire.



Post-opératoire et pronostic

La vision s'améliore très vite après la chirurgie. Des **consultations de contrôle** seront à prévoir et sont **importantes** pour surveiller **l'apparition de complications**. Pour empêcher les grattages, l'animal devra porter une **collerette** pendant environ 3 semaines et suivre un long traitement.

Les complications sont rares et les résultats souvent très satisfaisants (90% des cas). Malgré tout, cela reste une chirurgie, le risque zéro n'existe donc pas.

