

La toux du chenil chez le chien



Qu'est-ce que c'est ?

- La **toux du chenil**, aussi appelée **trachéobronchite infectieuse**, est une maladie **très contagieuse** et **fréquente** chez le chien.
- Elle est liée à différents agents pathogènes : des **virus** et des **bactéries**, qui ciblent les muqueuses de l'**appareil respiratoire** du chien.
- Le chien se contamine par **contact rapproché** avec un chien infecté. La toux du chenil est donc fréquente dans les **collectivités**, ou suite à un **rassemblement canin** (concours, cours d'éducation canine...).



Symptômes

Les symptômes apparaissent généralement **5 à 10 jours** après la contamination. Ils sont secondaires à l'inflammation des voies respiratoires :

- **Toux forte, sèche et rauque**
- Parfois **vomissements** secondaires à la toux
- Fatigue, perte d'appétit, parfois fièvre.

Ces symptômes peuvent durer **assez longtemps** (2 semaines). Il est donc important de mettre en place un traitement rapidement pour éviter les **complications** (surinfections bactériennes par exemple).

Pronostic

Le pronostic est **bon** si le traitement est mis en place **rapidement** et qu'il n'y a pas de complications.



Traitement

Différents traitements peuvent être prescrits en fonction de l'intensité des symptômes :

- **Antibiotiques** pour éliminer les bactéries
- **Anti-inflammatoires** pour limiter la toux et faire diminuer la fièvre
- **Repos.**

Ce traitement peut parfois être assez **long** (plusieurs semaines).

Prévention



Plusieurs **vaccins** existent contre les différents virus et bactéries responsables de la toux du chenil.

Les conseils de mon vétérinaire

