Le développement du chiot de la naissance à 3 mois

De la naissance à 15 jours : période néonatale

- dort 90 % du temps,
- rampe pour se déplacer,
- sourd (oreilles fermées),
- aveugle (yeux fermés),
- réflexe périnéal déclenché lorsque la mère lèche le bas ventre du chiot pour qu'il se soulage,
- a besoin de chaleur (mère ou lampe chauffante),
- réflexe de fouissement dès que sa tête trouve un obstacle il le pousse,
- réflexe de thermotactisme, recherche la chaleur ce qui l'aide à trouver le ventre de sa mère,
- sensible aux phéromones :
 - au niveau de chaque tétine pour la stimulation de la tétée,
 - dans le liquide amniotique pour le lien d'attachement,
 - o sur la ligne des mamelles pour l'apaisement.

De 15 jours à 21 jours : période de transition

- voit et entend (yeux et oreilles s'ouvrent),
- ses capacités sensorielles lui permettent de s'orienter,
- disparition des réflexes de fouissement, de thermotactisme et périnéal,
- lien d'attachement à sa mère.

De 21 jours à 2 mois : période de socialisation

- joue avec ses frères et sœurs, la queue de sa mère, des feuilles, des insectes,
- s'exerce physiquement à courir, sauter donc au bon développement musculaire et sensoriel,
- avec l'odorat, trouve le lieu d'élimination loin du nid, devient propre s'il a accès à l'extérieur,
- apprend à reconnaitre les odeurs (objets, êtres vivants),
- avec la vue, apprend les formes et les mouvements,
- avec l'ouïe, communique avec sa mère en gémissant, aboyant ou grognant, en répondant à ses appels,
- 4e semaine, <u>1res</u> <u>dents</u> (aliments solides possibles),
- mordille pour l'apprentissage des autocontrôles et du détachement,

- réprimandes par la mère lors des jeux, indispensable pour l'apprentissage des autocontrôles de la morsure inhibée et du détachement,
- réprimandes par la mère pendant les bagarres entre frères et sœurs : régulation de l'homéostasie sensorielle c'est-à-dire l'équilibre émotionnel,
- dans la période de socialisation il y a une période sensible de l'âge de 3 semaines à 3 mois qui se passe en 2 phases :
 - 1re phase de la 3e à la 5e semaine : attiré par tous les individus quelles que soient leurs espèces,
 - mémorise les caractéristiques spécifiques et les intègre dans son répertoire d'espèces connues.
 - un chiot manipulé par l'humain qu'après sa 5e semaine risque d'être moins familiarisé à celui-ci.
 - 2e phase de la 5e à la 7e semaine : l'attraction pour le nouveau diminue petit à petit jusqu'à 12 semaines.
 - toutes les espèces rencontrées après cette période seront plus longues à intégrer.

De 2 mois à 3 mois : période d'habituation et poursuite de la socialisation

- toutes les stimulations présentes dans l'environnement sont perçues et rangées comme agréables ou non.
- lors d'un stimulus nouveau si le chiot a peur, il se réfugie auprès de la mère qui le rassurera, l'évènement sera donc associé à du positif, si au contraire la mère a peur également, le chiot l'associera à du négatif.



