

Pyomètre

Chez la chienne



Qu'est-ce que c'est ?



Le **pyomètre** est une **infection de l'utérus** se développant généralement entre 3 et 8 semaines après un cycle de chaleurs. Les **hormones sexuelles** et les **bactéries** contribuent au développement du pyomètre :


- Lors des chaleurs, ces hormones entraînent la sécrétion de mucosités qui sont éliminées car le col de l'utérus est ouvert à ce moment du cycle. Toutefois **un dérèglement hormonal** maintient cette sécrétion après les chaleurs.
- L'**accumulation de ces mucosités** est un milieu idéal au développement des bactéries qui ont pu remonter jusque dans l'utérus.

S'il s'agit d'un **pyomètre à col ouvert** le pus s'écoule à l'extérieur.

S'il s'agit d'un **pyomètre à col fermé**, le pus s'accumule dans l'utérus ce qui est **plus grave** (les signes cliniques sont plus sévères et l'évolution plus rapide).

Le pyomètre peut être une urgence. La progression de l'infection peut entraîner le décès de l'animal.

Signes cliniques



- Des **écoulements vulvaires purulents**, nauséabonds et brunâtres (pour un pyomètre col ouvert), **chienne qui se lèche souvent la région vulvaire**.
- **Augmentation de la prise de boisson** et **augmentation du volume urinaire**.
- **Abattement** parfois très marqué, de la **fièvre** peut être présente.
- **Signes digestifs** : vomissements, diarrhée, douleur abdominale, perte d'appétit, ventre gonflé.
- **Une respiration rapide** et une accélération du rythme cardiaque.
- Parfois une boiterie peut être l'unique signe clinique.

Diagnostic

Le diagnostic passe par l'**historique de votre chienne**, la présence des **signes cliniques** et des examens d'imagerie : soit l'**échographie abdominale** (méthode de choix), soit la **radiographie**.

Des **analyses sanguines et d'urine** sont généralement réalisées en complément.



Traitement et pronostic

Votre animal sera **hospitalisé**, avec mise en place d'une **perfusion** pour corriger la déshydratation, d'**antibiotiques** et d'**anti-douleurs**. La **chirurgie** qui consiste à **retirer les ovaires et l'utérus** est le traitement de choix. Elle est réalisée une fois l'**animal stabilisé** pour limiter au maximum les risques anesthésiques.

Un **traitement médical** par injection hormonale associée à une antibiothérapie peut dans de rares cas être envisagé mais **il n'est plus recommandé** et le risque de **récidives** est de **70% lors des prochaines chaleurs**.

Si la **prise en charge est rapide** plus de **90%** des chiennes traitées et opérées récupèrent complètement. Lorsque l'état général de l'**animal se dégrade**, le **pronostic devient réservé**.

Cette maladie peut entraîner des **complications** pouvant entraîner le **décès** de l'animal.

Bien que **moins fréquent**, cette maladie peut aussi toucher nos amis les **chats**.

