

# La gestation chez la chienne



Une chienne n'a pas besoin d'avoir des chiots pour être en bonne santé physique ou mentale !!

## Durée de la gestation

- **Durée entre accouplement et mise bas très variable** (56 à 72 jours) : les ovules restent viables plusieurs jours et les spermatozoïdes peuvent rester vivants dans l'utérus jusqu'à une semaine après la saillie.
- Intérêt du suivi de chaleurs pour avoir une date de mise bas plus précise : en moyenne **63 jours après l'ovulation**.
- Gestation des races petites ou miniatures plus courte : en moyenne 61 à 62 jours.
- Gestation des portées très nombreuses plus courte par manque de place.
- Si 1 ou 2 chiots, la gestation peut se prolonger.

## Diagnostic de gestation

- **Palpation** : à partir de la troisième semaine et jusqu'à 30 ou 35 jours, puis de nouveau possible à partir de 45 ou 50 jours.
- **Échographie** : à partir de 24 ou 25 jours de gestation. Le dénombrement est difficile mais on peut savoir si la portée sera nombreuse ou non.
- **Dosage hormonal** : si aucune autre alternative n'est disponible, il est possible de doser la relaxine à partir de 25 jours. Le dosage de progestérone n'est pas possible en diagnostic de gestation chez la chienne : le taux reste élevé que la chienne soit gestante ou non.
- **Radiographie** : à partir de 50 jours, permet de dénombrer les fœtus. Comptage parfois difficile en cas de grosse portée ou de chienne de grand format.

## Soins pendant la gestation

- La mère doit être **correctement vaccinée** avant la gestation. La vaccination n'est pas recommandée pendant la gestation.
- Traiter la future mère contre **les parasites externes** avec des produits sans danger pour la gestation : les puces peuvent transmettre les vers plats (ténia).
- **Vermifuger** la mère au début des chaleurs et **15 jours environ avant la mise bas** : les vers ronds (ascaris et ankylostomes) sont transmis par léchage des excréments mais également durant la gestation à travers le placenta !
- La future mère sera sous **surveillance attentive**. Les changements de comportement (baisse d'appétit, baisse d'activité) sont normaux. Cependant **tout comportement inhabituel, écoulement vulvaire (surtout si nauséabond), vomissements répétés, fièvre... doivent faire l'objet d'une consultation vétérinaire rapide !**

## Alimentation



- **Besoins énergétiques : + 10% par semaine** à partir de la cinquième semaine.
- **Fractionner la ration** en 2 ou 3 repas car l'utérus prend beaucoup de place dans le ventre et pousse l'estomac.
- Utiliser un **aliment complet de bonne qualité** et ne surtout pas compléter en calcium !!

## Les conseils de mon vétérinaire

